



## 716 farine reproduction de race

farine complète pour poules en pleine période de ponte, au minimum 6 - 8 semaines avant la collecte des oeufs de couvaison, et pour coqs

Emballage disponible:

20.0 kg



### Conseils d'alimentation

- garder les enclos d'élevage en parfait état avec 716 graines de couvain de race ou 717 graines de couvain de race
- n'ajoutez rien pour éviter les dépôts graisseux. Les poules minces commencent à pondre plus facilement

### Composition:

maïs, tourteau d'extraction de soja dépelliculé cuit, blé, aliment de gluten de maïs, luzerne, coquilles de mer broyées, pierres a chaux, tourteau d'extraction de colza, l'huile de soja, levure de bière, lécithine

### constituants analytique/Kg

protéine brute 17,5 %, grasses brutes 4,7 %, cellulose brute 4,6 %, cendres brute 12,2 %, calcium 32,88 g, phosphore 6,62 g, sodium 1,61 g, lysine 8,6 g, méthionine 3,48 g

**Des questions sur cet aliment?**

T +31 ((0)313) 47 23 21  
E [advies@garvo.nl](mailto:advies@garvo.nl)  
W [www.garvo.nl/fr](http://www.garvo.nl/fr)



### **Additional/kg Vitamines**

3a672a Vitamin(e) A 10000 IE, 3a671 Vitamin(e) D3 2000 IE, 3a700 Vitamin(e) E 83 mg

### **Additional/kg Trace**

civre (3b413 Cu(II)chélate d'hydrate de glycine, solide) 14 mg, zinc (3b607 Zn-chélate de glycine hydrate) 47 mg, manganoux (3b506 Mn-chélate de glycine hydrate) 95 mg, fer (3b103 Fe(II)monohydrate de sulfate) 68 mg, iode (3b202 calcium iodate anhydre) 1 mg, sélénium (3b812 Se-organique CNCM 1-3399) 0.15 mg

### **Additional/kg colorants**

2a161g de canthaxanthine 3.5 mg, 2a161b lutein(e) (souci) 3.1 mg

#### **Des questions sur cet aliment?**